

お詫びと訂正

単行本「薬局で役立つ皮膚科治療薬FAQ」に、下記の誤りがございました。

p71処方例中

	誤	正
【病変感染がある場合】		
ルレリッド錠(150mg)	1回2錠	1回1錠

p91処方例中

	誤	正
【鎮痛薬】		
【その他成人例で疼痛の著しい場合は下記の薬剤を使用する】		
プレドニン錠(5mg)	1回12錠	1回4～6錠
リンデロン錠(0.5mg)	1回6錠	1回2～3錠
トリプタノール錠(10mg)	1回1～6錠	1回1～3錠

p116処方例中

	誤	正
【天疱瘡】		
プレドニン錠(5mg)	1回8錠	1日8錠
ケルナックカプセル(80mg)	1回6カプセル	1回2カプセル
ガスター-D錠(20mg)	1回2錠	1回1錠
【類天疱瘡】		
アクロマイシンVカプセル(250mg)	1回6カプセル	1回2カプセル

p124処方例中

	誤	正
【肝斑】		
シナール錠(200mg)	1回3錠	1回1錠
トランサミンカプセル(250mg)	1回3カプセル	1回1カプセル

p127処方例中

	誤	正
【熱傷瘢痕】		
リザベンカプセル(100mg)	1回3錠	1回1錠

p132処方例中

	誤	正
【凍瘡】		
ユベラNソフトカプセル(200mg)	1回3カプセル	1回1カプセル

p136処方例中

	誤	正
【ステロイド内服療法】		
②ムコスタ(100mg)	1回3錠	1回1錠
③ガスター錠(20mg)	1回2錠	1回1錠
【免疫抑制薬】		
①ネオオーラルカプセル(50mg)	1回4カプセル	1回2カプセル

p140処方例中

	誤	正
【疾患修飾薬】		
プレドニン錠(5mg)	1回4～6錠	1回2～3錠
【循環障害に対して】		
ユベラニコチネートカプセル(100mg)	1回6カプセル	1回2カプセル
プロサイリン錠(20μg)	1回3～6錠	1回1～3錠
ドルナー錠(20μg)	1回3～6錠	1回1～3錠
アンブラーク錠(100mg)	1回3錠	1回1錠
【逆流性食道炎に対して】		
パリエット錠1(10mg)	1回2錠	1回1錠
ガスマチン錠(5mg)	1回3錠	1回1錠
【肺高血圧症に対して】		
トラクリア錠(62.5mg)	1回1～2錠	1日1～2錠
【乾燥症状(シェーグレン症候群に対して)】		
サラジェン錠(5mg)	1回2～3錠	1日2～3錠

p144処方例中

	誤	正
【乾燥症状】		
サリグレンカプセル(30mg)	1回3カプセル	1回1カプセル

p158処方例中

	誤	正
【多形滲出性紅斑】		
③ヨウ化カリウム丸(50mg)	1回18錠	1回6錠
ロキソニン錠(60mg)	1回3錠	1回1錠
【ベーチェット病による結節性紅斑】		
コルヒチン錠(0.5mg)	1回2錠	1回1錠
【溶連菌感染を伴う結節性紅斑】		
①ユナシン錠(375mg)	1回3錠	1回1錠

執筆者ならびに読者の皆様方にご迷惑をおかけ致しましたこととお詫び申し上げますとともに、謹んで訂正させていただきます。

株式会社メディカルレビュー社 編集部